

Curacid Curaman – Vollviruzide Händedesinfektion (RKI)

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit zur hygienischen Händedesinfektion. Curacid Curaman ist hochwirksam gegen Viren und zeichnet sich durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus.

Der hohe Anteil an Ethanol ermöglicht auch eine gute Wirksamkeit gegen Viren in kurzer, praxistauglicher Zeit.

Curacid Curaman ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.

Wirksame Bestandteile in 100g

73,5g Ethanol (80% Ethanol)

sonst. Bestandteile: Denatoniumbenzoat, VE-Wasser

Anwendungsgebiete

Hygienische Händedesinfektion. Geeignet für alle Bereiche zur menschlichen Hygiene mit hohen Anforderungen an die Händehygiene in Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen sowie in Industrie und Labor.

Wirkungsspektrum/Begutachtung

- bakterizide und fungizide Wirkung nach EN 1500 entsprechend der Anwendungsempfehlung der VAH, 15 Sekunden/mind. 3 ml
- Viruzid wirksam nach EN 14476, auch gegen Noro-, Adeno, und Polioviren
- RKI-gelistet, Wirkungsbereich A
- begutachtet u. a. auch nach den Richtlinien der VAH
- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, Corona

Dosierung und Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion werden 3 ml in die hohle Handfläche gegeben und sofort mind. 15 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass immer auch alle Fingerzwischenräume, Fingernagelfalze und Hautfalten vollständig und über die gesamte Einwirkzeit benetzt werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit ist die Desinfektion abgeschlossen.

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut) ist die Einwirkzeit zu verlängern.

Einwirkzeiten:

Hygienische Händedesinfektion	
gem. VAH	15 Sek.
RKI (Wirkungsbereich A)	30 Sek.
BVDV	15 Sek.
Noro	15 Sek.
Rota	15 Sek.
Vaccinia	15 Sek.
MRSA	15 Sek.
TB	30 Sek.
Adeno	60 Sek.
SV40	60 Sek.
Polio	2 Min.

Curacid Curaman wirkt gegen unbehüllte und behüllte Viren und ist gem. RKI. vollviruzid.

Vermeidung von Anwendungsfehlern

Stark verschmutzte Hände sollten vor der Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nasse Hände vor der Desinfektion erst trocknen lassen. Curacid Curaman ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Warnhinweise

Nur zur äußeren Anwendung. Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Lieferformen

500ml Flasche
1000ml Flasche
5L Kanister

